

Verhaltensregeln bei Terminen in der Transfusionsmedizin:

- Essen Sie bitte nur ein leichtes Frühstück (z.B. trockenes Brot, Brötchen)
- Trinken sie ausreichend (z.B. Wasser, Tee/Kaffee ohne Milch u. Zucker)

Zur Beachtung bei Medikamenten-Einnahme :

Xarelto , Lixiana[®], Eliquis[®] oder Pradaxa[®]:

letzte Einnahme 24 Stunden vor der Vorstellung

(Dosis am Vorabend der Vorstellung und am Morgen des Vorstellungstages **nicht** einnehmen, wenn Sie das blutverdünnende Medikament 2 x täglich einnehmen, bei einmal täglicher Einnahme sollte die Dosis am Vorabend der Vorstellung oder am Morgen des Vorstellungstermins **nicht** eingenommen werden.)

Eine Einnahme-bzw. Anwendungspause ist nicht erforderlich bei der Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten(z.B. Marcumar[®]) sowie bei ASS, Clopidogrel und niedermolekularen Heparinen (z.B. Mono-Embolex, Innohep, Clexane usw. - hier sollte die letzte Applikation bitte 3-4 Stunden vor der Vorstellung erfolgen!)

Nach erfolgter Blutentnahme kann die Medikamenteneinnahme wie gewohnt erfolgen.